

| | | |
|--|---|--|
|  <p>Regione Lombardia ASL Bergamo</p> | <p>ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO</p> <p>COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE</p> |  <p>Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo</p> |
|--|---|--|

PREPARAZIONE PER CLISMA OPACO A DOPPIO MEZZO DI CONTRASTO (per pazienti di età superiore ai 14 anni)

Per la buona riuscita dell'esame è indispensabile la collaborazione del paziente, che è pregato di attenersi esattamente e rigorosamente alle prescrizioni che seguono e di assumere solo medicinali, cibi e bevande indicati, nelle quantità e agli orari prescritti.

Al proposito si fa presente che i residui fecali nell'intestino possono mascherare le eventuali lesioni della parete intestinale o creare false immagini sospette che rendono necessaria la ripetizioni dell'indagine radiologica o il ricorso all'esame endoscopico.

Le **uniche controindicazioni** alla preparazione sotto illustrata sono :

- occlusione intestinale
- stati di grave compromissione della salute
- pazienti di età inferiore ai 14 anni

In ciascuno di questi casi occorre rivolgersi direttamente allo specialista Radiologo per una preparazione specifica mirata.

I Pazienti per i quali è richiesto **Clisma Opaco con doppio mezzo di contrasto** devono sottoporsi alla seguente preparazione per i tre giorni precedenti l'esame.

1. Nei due giorni precedenti l'esame: seguire una dieta priva di scorie.

In particolare non devono essere assunti i seguenti cibi o bevande: frutta, verdura, legumi, cereali, pane, pasta, riso, biscotti, grissini, fette biscottate, vino, dolci, liquori, acqua gassata.

Sono permessi: latte, yogurt, formaggio, carne, pesce, brodo, omogeneizzati, succhi di frutta, uova, acqua naturale.

2. Giorno precedente l'esame :

Colazione: fare colazione con gli alimenti permessi indicati sopra e assumere 12 compresse di PURSENNID con un bicchiere di acqua tiepida, oppure Xprep a dose intera, oppure altro lassativo di medesima composizione

Pranzo: assumere solo uova o pesce o carne

Ore 16.00: 2 cucchiaini da tavola (15 gr) di solfato di magnesio ("sale inglese") diluiti in 1 bicchiere di acqua tiepida

Tra le ore 16.00 e le ore 20.00: bere almeno 8 bicchieri d'acqua (circa 1,5 l.)

Cena: 1 tazza di brodo magro di carne o the

3. Il giorno dell'esame : a digiuno assoluto, per solidi e liquidi, da almeno 8 ore prima dell'esame

Si avvisa che **il/la paziente dovrà essere accompagnato/a da una persona in grado di guidare**, comunque da una persona maggiorenne responsabile, in quanto, in qualche caso, potrebbe essere somministrato un farmaco che compromette la guida nelle ore successive l'indagine.

In tali casi è prevista una permanenza in osservazione di circa 30 minuti presso la struttura ambulatoriale.

Si raccomanda di portare eventuale documentazione precedente (esami radiologici e/o ecografici con i referti) relativa alla richiesta.

In caso di rinuncia si prega di avvisare tempestivamente chiamando il numero telefonico



Regione
Lombardia

ASL Bergamo

ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE
STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE
E PRIVATE ACCREDITATE



Azienda Ospedaliera
Papa Giovanni XXIII
Bergamo

CLISMA OPACO A DOPPIO MEZZO DI CONTRASTO کی تیاری (صرف ان مریضوں کے لیے جن کی عمر 14 سال سے زیادہ ہے)

ٹیسٹ صحیح طریقے سے ہو سکے اس کے لیے مریض کا تعاون نہایت ضروری ہے۔ براہ مہربانی کر کے مندرجہ ذیل ہدایات پر سختی سے عمل کریں صرف وہ دوائیں اور چیزیں کھائیں اور پیئیں جو بتائی گئی ہوں، اسکے علاوہ وقت اور مقدار کا پابندی سے خیال رکھیں۔

اس سلسلے میں یہ معلومات ضروری ہے کہ اگر انٹریوں میں کچھ اندرونی اخراج باقی رہ جائے تو وہ انٹریوں کے زخموں کو چھپا سکتا ہے یا مشتبہ تصویروں کی وجہ سے ٹیسٹ کو دوبارہ کرنا پڑ سکتا ہے یا پھر مزید کوئی اور ٹیسٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

صرف مندرجہ ذیل حالات میں جو ٹیسٹ کی تیاری بتائی جائی گی وہ مت کریں:
- انٹریوں میں رکاوٹ
- صحت کی شدید خرابی
- مریض کی عمر 14 سال سے کم

ان سب حالات میں آپ Radiologist سے رجوع کریں جو آپ کو کوئی مخصوص تیاری تجویز کرے گا۔

جن مریضوں نے **Clisma Opaco con doppio mezzo di contrasto** ٹیسٹ کروانا ہے انہیں یہ تیاری تین دن ٹیسٹ سے پہلے کرنی پڑے گی

1. دو دن ٹیسٹ سے پہلے ہلکا کھانا کھائیں۔ خاص طور پر ان چیزوں کا استعمال بند کر دیں جیسے کے فروٹ، سبزیوں، دالیں، آناج، روٹی، چاول، پاستا، بسکٹ، رس، شراب، میٹھا، کاربونیٹڈ پانی، وغیرہ۔

آپ یہ چیزیں کھا سکتے ہیں: دودھ، دہی، پنیر، گوشت، مچھلی، سوپ، جوس، انڈے، قدرتی پانی، بچوں کی خوراک۔

2. ایک دن ٹیسٹ سے پہلے:

کی ایک ناشتہ: ناشتہ صرف ان چیزوں سے کریں جن کی اجازت اوپر دی گئی ہے اور ناشتے کے بعد 12 گولیاں PURSENNID گلاس پانی کے ساتھ لے لیں، یا پھر Xprep کی ایک پوری خوراک، یا کوئی اور پیٹ کو صاف کرنے والی دوائی جس کا کو مپوزیشن ان دوائیوں جیسا ہو۔

دوپہر کا کھانا: صرف انڈے یا مچھلی یا پھر گوشت کھا سکتے ہیں۔

16:00 بجے: دو چمچ (15 گرام) میگنیشیم سلفیٹ ایک گلاس نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیں۔

16:00 بجے اور 20:00 بجے کے درمیان: 8 گلاس پانی پینا ہے۔

رات کا کھانا: ایک کپ گوشت کا سوپ یا صرف چائے لے سکتے ہیں۔

3. ٹیسٹ والے دن: کم از کم ٹیسٹ سے 8 گھنٹے پہلے کھانا پینا بند کر دیں۔

یاد رکھیں مریض کے ساتھ ایک اور ذمہ دار فرد کا ہونا ضروری ہے، جو گاڑی چلا سکے، کیونکہ جو دوائیں ٹیسٹ کے دوران استعمال کی جاتی ہیں، وہ کبھی کبھی گاڑی چلانے کی صلاحیت کو چند گھنٹوں کے لیے کمزور کر دیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ کے بعد آپ کو ہسپتال میں 30 منٹ کے لیے رکنا پڑے۔

براہ مہربانی کر کے ٹیسٹ والے دن پچھلا میڈیکل ریکارڈ لے کر آئیں (مثال کے طور پر ایکس رے، الٹراساؤنڈ ٹیسٹ، وغیرہ)۔

اگر آپ کسی وجہ سے ٹیسٹ والے دن نہیں آ سکتے، تو براہ مہربانی فون کر کے آگاہ کر دیں۔