

 <p>Regione Lombardia</p> <p>ASL Bergamo</p>	<p>ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO</p> <p>COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE</p>	 <p>Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo</p>
---	---	--

Raccomandazioni per il paziente dopo Esofagogastroduodenoscopia con sedazione

Gentile Signora, Egregio Signore,

Lei è stata/o da poco sottoposta/o ad una indagine endoscopica del tratto digestivo superiore ed ha ricevuto sedazione endovenosa. Riteniamo pertanto utile fornirle alcuni consigli e indicazioni.

Può alimentarsi dopo circa 30 minuti dal termine dell'esame, salvo diversa indicazione.
Può riprendere la normale assunzione delle sue medicine da stasera stessa.

Occorre stare a riposo per almeno 6 ore, durante le quali non può guidare l'auto o svolgere attività potenzialmente pericolose ed è opportuno bere ed alimentarsi in modo leggero.

Potrebbe rimanere un leggero indolenzimento a livello della parte interessata dall'esame endoscopico e/o gonfiore addominale se è rimasta aria nello stomaco, ma ciò si risolve di solito entro qualche ora.

Qualora dovesse accusare dolore severo e/o vomito o comparisse febbre avverta subito il suo medico curante e/o il medico endoscopista.

Numero telefono struttura:

 <p>Regione Lombardia</p> <p>ASL Bergamo</p>	<p>ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO</p> <p>COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE</p>	 <p>Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo</p>
---	---	--

Esofagogastroduodenoscopia with sedative RECOMMENDATIONS AFTER THE EXAM

Dear Madam / Dear Sir,

You have just taken an endoscopic exam with sedative of the upper digestive side.
These are a few helpful recommendations after the exam:

- ✓ You can eat or drink lightly after about 30 minutes from the end of the exam (unless you have had different instructions)
- ✓ You can start taking your medicines again from tonight
- ✓ For at least 6 hours after the exam you must rest. Do not drive or do anything likely to be dangerous, you can eat and drink lightly.

You may have a light stiffness of the part affected by the exam or a swollen stomach if there is some air inside, but this passes spontaneously, usually within a few hours.

If instead you have important pains, vomit or a temperature, you must call immediately your doctor or the doctor of the hospital where you have taken the exam.

Hospital telephone number: