

**PREPARAZIONE A TC
CON MEZZO DI CONTRASTO IODATO ENDOVENOSO**

التحضير للتصوير المقطعي المحوسب
باستخدام اليود كمادة مظلمة في الوريد

(da compilare a cura del Medico prescrittore, barrando ove necessario. Si prega cortesemente di rispondere a tutte le domande indicate)

Il/La Sig./Sig.ra. ha la necessità di
essere sottoposto/a a
per la seguente indicazione.

(no) لا (si) نعم هل المريضة في حالة حمل (مؤكد او مفترض) اوفي مرحلة الرضاعة: نعم (si) لا (no)
La paziente è in stato di gravidanza (certa o presunta) o in fase di allattamento

تعاني بتاريخ:

Presenta in anamnesi:

نعم (si) لا (no)

البرابروتين لولدستروم (Paraproteinemia di Waldenström)

قصور كبدي حاد (Insufficienza epatica grave)

قصور كلوي معتدل \ حاد (Insufficienza renale moderata/severa)

ورم نخاعي حاد (Mieloma multiplo)

حالات شديدة لفشل عضلة القلب أو فشل في الأوعية الدموية

(Stati di grave insufficienza del miocardio o di insufficienza cardiocircolatoria)

التسمم الدرقي (Ipertireosi)

مرض السكري مع علاج بالميتفورمين (Diabete in trattamento con Metformina)

علاج جار مضاد للتخثر عن طريق الفم (È in corso terapia anticoagulante orale)

**IN CASO AFFERMATIVO INVIARE IL
PAZIENTE ALLA STRUTTURA CHE
ESEGUIRÀ L'INDAGINE**

أهبة الحساسية
Diatesi allergica

Si No

يجب على المريض احضار نتائج التحاليل الاخيرة غداء يوم الفحص (30 يوما على الأكثر من موعد الفحص) الخاص بـ:
- الكرياتينين
- الجلوكوز

Il paziente deve presentarsi il giorno dell'esame con gli esiti recenti (massimo 30 giorni precedenti la data di esecuzione dell'esame) di

- CREATININEMIA
- GLICEMIA

Data

Firma del medico

ملاحظة: يجب القيام بالتصوير المقطعي للصدر والبطن بيومين على الاقل من اجراء الفحوصات الاخرى (الاشعة السينية للجهاز الهضمي ، تصوير الجهاز البولي، ...) وكذلك تلك الخاصة بالمنظار الداخلي.

N.B. La TC del torace e dell'addome va effettuata dopo almeno 2 giorni dall' esecuzione di altre indagini contrastografiche (studi radiografici dell'apparato digerente, urografie, interventistica, ecc...) e dall' esecuzione di indagini endoscopiche.

PREPARAZIONE ALL'ESAME CON MEZZO DI CONTRASTO

التحضير للفحص

يجب شرب الماء الكثير (ما لا يقل عن 1,5 لتر من الماء) بيوم واحد قبل اجراء الفحص الامتناع عن اكل الطعام الصلب وشرب السوائل 4 ساعات قبل اجراء الفحص استعمال العلاج المعتاد في البيت وفقا لارشادات طبيب الاسرة ماعدا:
- الميتفورمين التي يجب التوقف عن أخذها بيومين قبل اجراء الفحص
- ب بلوكانت وأتش إنبييتوري التي يجب التوقف عن أخذها يوم إجراء الفحص (لأنها يمكن ان تؤدي الى تفاقم انخفاض ضغط الدم وتقلل من فعالية علاجها)

Abbondante idratazione (almeno 1.5 litri di acqua) il giorno prima dell'esame.

Digiuno per cibi solidi e liquidi da almeno 4 ore prima dell'esame.

Assumere l'abituale terapia domiciliare secondo l'indicazione del proprio medico di base ad esclusione di

- *Metformina che deve essere sospesa nei due giorni precedenti l'esame*
- *β -bloccanti ed ACE-inibitori che devono essere sospesi il giorno dell'esame (perchè possono aggravare le ipotensioni e rendere inefficace il loro trattamento).*

ملاحظة

- تجدر الإشارة على أن المريض يجب أن يحضر مصحوبا بشخص بالغ ومسؤول وقادر على السياقة نظرا

لكون الأدوية المستخدمة قد تؤثر على السياقة في الساعات الموالية للفحص.

- يمكن ابقاء المريض في الغرفة 30 دقيقة بعد الفحص.

NOTA BENE

- *si ricorda che **il/la paziente dovrà essere accompagnato/a da una persona in grado di guidare**, comunque da una persona maggiorenne responsabile, in quanto i farmaci somministrati durante l'esame possono compromettere la guida nelle ore successive l'indagine*
- *potrebbe essere prevista, dopo l'esame, una permanenza in struttura per almeno 30 minuti.*